

والدین گرامی:

با آرزوی سلامتی برای شما مطالب فوق به منظور آشنایی با مسمومیت با متادون و مراقبت های لازم در مورد آن تهیه شده است. امیداست با مطالعه مطالب قادر باشید دوره درمان فرزند خود به خوبی مدیریت نمایید.

مسمومیت با متادون چیست؟

متادون یک داروی مخدر شیمیایی تسکین دهنده درد و مشابه مورفین می باشد.

این دارو علائم برگشتی در افراد وابسته به مواد مخدر را کاهش میدهد. از مهمترین انواع مسمومیت اتفاقی در کودکان، میتوان به مسمومیت ناشی از شربت متادون اشاره کرد.

مسمومیت کودکان در ۸۰ درصد موارد در سنین بین ۱ تا ۴ سال ایجاد می شود.



علائم:

نشانه های مسمومیت ناشی از مصرف خودسرانه دارو و مواد مخدر بر حسب نوع دارو و مقدار مصرف فرق می کند.

علائم معمول مسمومیت با مواد مخدر در کودکان عبارتند از:

خواب آلودگی

بی حالی و شل شدن عضلات

گشاد یا تنگ شدن مردمک چشمها به صورت غیرعادی

سطحی و کندشدن تنفس

تهوع و استفراغ، ولی همیشه استفراغ بلافاصله پس از مصرف ایجاد نمی شود .

درد قفسه سینه و دیگر علائم مسمومیت بعد از مدت کوتاهی ظاهر شده و پس از گذشت چند ساعت با پیشرفت علائم، کودک جان خود را از دست میدهد .

تشنج، یکی از واکنش های کودک به مسمومیت با متادون و مواد مخدر است.

درمان:

در صورت مشاهده علائم مسمومیت یا شک به مسمومیت سریعاً به اورژانس مراجعه کنید و در همان ابتدای ورود به پزشک واقعیت را بگویید.

در مواردی که تعداد تنفس کمتر از ۱۲ بار در دقیقه و کودک خواب آلود باشد حتی اگر مردمکها تنگ نباشد بدون فوت وقت و انتظار برای نتیجه آزمایش باید به درمان اقدام نمود.

باید سریعاً از کودک رگ گرفته شود تا دارو و مایعات به وی تزریق شود.

کودک نباید زودتر از ۴۸ ساعت از بیمارستان ترخیص شود.



پیشگیری:

- از آنجایی که طعم شربت متادون شیرین است و افراد در حال ترک آن را به همراه چای یا نوشابه مصرف می نمایند از نگهداری دارو در یخچال یا کنار سایر نوشیدنی ها خودداری کنید.
- دارو را دور از دسترس اطفال و در قفسه های قفل دار نگهداری کنید.
- از مصرف دارو در زمان حضور کودک خودداری کنید.
- دارو را در ظرف هایی با درب مقاوم که کودک قادر به باز کردن آن نباشد نگهداری کنید.
- به کودکانی که متوجه می شوند، خطرات مصرف آن را بگوئید.

توجه:

- از نگهداری شربت متادون، حتی در مقدار بسیار پایین، در شیشه های غیر دارویی نظیر بطری نوشابه و ... و شیشه های بدون برچسب نام دارو اکیدا خودداری کنید.

نکات مهم:

متأسفانه سالانه تعدادی از کودکان کشورمان به دلیل مصرف ناخواسته شربت متادون که در شیشه داروهای دیگری نگهداری می شده است به کام مرگ می روند.

کودکان به علت کنجکاوی، زمانی که یک فرد در حال خوردن دارو هست را ببینند، ممکن است اقدام به تقلید از وی کنند و در زمانی که والدین در منزل نیستند دارو را بخورند.

اگر به کودک خود دارو می دهید به او تفهیم کنید که این دارو است و از کلماتی مثل آب نبات، شکلات و یا خوراکی استفاده نکنید.



منبع: پرستاری کودکان مارلو



بیمارستان ولیعصر (عج) شهرستان بردسکن (عج)

مسمومیت با متادون در کودکان



شماره تماس: ۰۵۱ ۵۵۴۲۲۴۰۱ - اطفال ۱۲۵

تاریخ تهیه: ۱۴۰۱ - تاریخ بازنگری: ۱۴۰۳

شماره سند: EDU/۲۱۸/۱۴۰۰/P.W.C

واحد آموزش سلامت