

تعریف بیماری:

پریتونیت عفونت یا التهاب قسمتی از صفاق (پرده پوشاننده لوله گوارشی) یا همه آن است. پریتونیت نشان دهنده سوراخ شدن دیواره روده است که محتوای روده از جمله باکتری به داخل حفره شکم وارد میشود. میکروب ممکن است از طریق دستگاه گوارش و در زنان از طریق اندام های تولید مثل منجر به عفونت شود. پریتونیت به طور بالقوه تهدیدکننده زندگی است و نیاز به درمان اورژانسی و عمل جراحی دارد.

علل ایجاد کننده:

- ❖ پارگی یا سوراخ شدگی هر عضو داخل شکمی، نظیر آپاندیسیت، زخم گوارشی
- ❖ آسیب به دیواره شکم مثلاً در اثر چاقو یا گلوله
- ❖ بیماری التهابی لگن
- ❖ پارگی حاملگی نابجا



علائم:

- درد سراسر شکم یا قسمتی از آن. بیمار اغلب ترجیح می دهد که به پشت بخوابد و هیچ گونه حرکتی نکند زیرا حرکت یا فشار به شکم باعث افزایش این درد می شود.
- درد شانه (گاهی)
- لرز و تب (اغلب تب بالا)
- منگی و ضعف
- تندی ضربان قلب
- فشارخون پایین
- تهوع و استفراغ
- تشنگی

تشخیص:

- انجام معاینه توسط پزشک
- انجام آزمایش خون
- تستهای تصویر برداری



درمان:

بر اساس دلیل به وجود آورنده پریتونیت درمان انجام میشود.

- درمان جراحی
- مصرف آنتی بیوتیک
- مایع درمانی
- مسکن ها
- ضد استفراغ
- لوله گذاری روده

- **نکته:** تاخیر در درمان این بیماری و بروز عوارض آن میتواند کشنده باشد.



بیمارستان ولیعصر (عج) شهرستان بردسکن

پریتونیت

پریتونیت



شماره تماس: ۰۵۱ ۵۵۴۲۲۴۰۱ - داخلی ۱۰۶

تاریخ تهیه: ۱۴۰۰ - تاریخ بازنگری: ۱۴۰۲

شماره سند: EDU/215/۱۴۰۰/S.W.C

واحد آموزش سلامت

- در صورت تب تهوع استفراغ احساس تشنگی ناتوانی در دفع گاز و مدفوع درد شدید شکم ترشح و قرمزی بخیه ها سریعا به پزشک مراجعه کنید اگر دچار درد شدید شکمی هستید، دردی که مانع از نشستن شما می شود فوراً به دنبال دریافت مراقبت های پزشکی باشید.

اگر پریتونیت به سرعت درمان نشود ممکن است عفونت به جریان خون وارد شود و باعث شوک و آسیب به ارگان های دیگر شده که می تواند کشنده باشد.

منبع:

داخلی جراحی برونر سودارث

مراقبتها:

- تا پایان بستری مایعات و مواد مغذی از طریق وریدی برای شما تجویز می شود.
- پس از درمان، تا برطرف شدن علائم در بستر استراحت نمائید.
- تا فروکش التهاب حاد از خوردن هرگونه غذا یا آشامیدنی خودداری کنید تا لوله گوارشی بتواند استراحت کند.
- هنگامی که دستگاه گوارشی تحمل خوراکی را پیدا کرد می توانید تغذیه دهانی را از سر بگیرید.
- ممکن است که به صورت موقت کلهتومی شوید (باز کردن روده روی شکم جهت تخلیه مواد دفعی) که باید از کیسه های مخصوص استفاده کنید.
- مراقبت از پوست اطراف استومی بسیار مهم می باشد.
- کلیه آموزشهای مربوط به استومی توسط پرستار به شما داده می شود.